




สำนักข่าว Israel News

รายงานที่ สถานการณ์โควิดในอิสราเอลกำลังกลายเป็น
การระบาดใหญ่เฉพาะในหมู่คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ในปัจจุบัน 15% (ประมาณ 1,105,000 คน) ของชาวอิสราเอลที่มีอายุเกิน 12 ปี และ 10% (ประมาณ 755,000 คน) ที่มีอายุเกิน 20 ปี ยังคงไม่ได้รับวัคซีน ถึงแม้ว่าจะมีสิทธิรับวัคซีนก็ตาม และคนกลุ่มนี้เองที่มีรายงานว่าเป็นคนส่วนใหญ่ที่พบในกลุ่มผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตของอิสราเอล และกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักที่รักษาตัวอยู่ในวอร์ดผู้ป่วยโควิดและ ICU ในอิสราเอลนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุ 40 - 60 ปี เป็นส่วนใหญ่ และส่วนน้อยจากกลุ่มประชากรอายุ 20 - 40 ปี

อัตราผู้ป่วยอาการรุนแรง และอัตราการตายในอิสราเอล



ทั้งนี้ หากดูแต่อัตราการเสียชีวิตจากโควิดและเปรียบเทียบตัวเลขของผู้ไม่ได้รับวัคซีนโดยตรง อาจจะทำให้ข้อมูลไม่สะท้อนความเป็นจริงได้ ศาสตราจารย์ Eyal Leshem ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์การเดินทางและโรคเขตร้อนที่ศูนย์การแพทย์ Sheba เมือง Tel Hashomer แนะนำให้ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการตายต่ออัตราประชากร แทนที่จะใช้ข้อมูลดิบในการวิเคราะห์ โดยจะพบได้ว่า

เปรียบเทียบอัตราการตายต่อจำนวนประชากร 100,000 คน

เข็มวัคซีน	อายุมากกว่า 60 ปี		อายุน้อยกว่า 60 ปี	
	ไม่ได้รับวัคซีน ✗	ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ✓✓	ไม่ได้รับวัคซีน ✗	ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ✓✓
ไม่ได้รับวัคซีน ✗	6.3 คน	1.3 คน	0.04 คน	0.02 คน
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ✓✓	1.3 คน	0.1 คน	0.02 คน	0.01 คน
ได้รับเข็มกระตุ้น ✓✓✓	0.1 คน		0.01 คน	



วัคซีนส่งผลต่อ
อัตราการเสียชีวิต
อย่างมีนัยสำคัญ

ขอขอบคุณ

คณะกรรมการ MIU (Ministry of Public Health – Intelligence Unit) กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)